Moč

Moč	
Metoda	Kultivační průkaz bakteriálních původců infekcí močových cest.
Primární vzorek (biologický materiál)	Moč (2 - 5 ml)
Odběrová souprava	 Sterilní močová zkumavka
Pokyny k odběru a příprava pacienta	**Spontánní moč:** Odebírejte nejlépe první ranní moč. Řádně si umyjte ruce a genitálie mýdlem a vodou. První proud moči nechte odtéct do toalety. Následující (střední) proud moči zachyťte do odběrové nádobky. Nedotýkejte se vnitřku nádobky. Po odběru nádobku těsně uzavřete. Umyjte nádobku a znovu si umyjte ruce. Nádobku s močí do 2 hodin doručte k vašemu lékaři nebo do laboratoře. Pokud je předpokládaná doba doručení delší, nádobku s močí uchovávejte v lednici. **Cévkovaná moč:** Získá se jednorázovým cévkováním močového měchýře sterilním katetrem. **Moč z permanentního katetru (PMK):** Odebírejte pouze z katetru nově zavedeného (tj. po jeho výměně).
Podmínky transportu	Chladící box: 2 - 8°C
Stabilita	Chladničková teplota, doručit co nejdříve, max. do 24 hodin.
Doordinace	

Moč	
Doba dodání	Negativní: 5 – 24 hodin (závisí na metodě, viz poznámka) Pozitivní: 24 – 72 hodin (závisí na metodě, viz poznámka)

Poznámka:

Všechny vzorky o objemu alespoň 1 ml a doručené do laboratoře do 14:00, jsou ještě toho dne zpracovány v automatickém analyzátoru UROQUATTRO (výkon č. 82024). Výhodou této metody je, že negativní výsledek obdržíte již v den odběru, pozitivní výsledek do 24 - 48 hodin. Moče o objemu nižším než 1 ml nebo dodané do laboratoře po 14:00 hodin jsou zpracovávány klasickou semikvantitativní metodou pomocí kalibrovaných kliček (výkon č. 82015). Negativní výsledek je poté k dispozici za 24 hodin, pozitivní za 48 - 72 hodin.

Související vyšetření:

Požadavek na mykologické vyšetření, průkaz MRSA je nutné vyznačit na žádance zvlášť.

Průkaz *Neisseria gonorrhoeae* doporučujeme provádět z moči pouze PCR metodou, kultivační průkaz z moči, zejména u žen, není validní. Pro kultivační průkaz doporučujeme odběr cervikálního výtěru nebo stěru z uretry u mužů odebrané vatovým tampónem s transportním médiem AMIES.

Pro průkaz *Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum* a *Chlamydia trachomatis* odebírejte první proud ranní moči (muži), u žen volte pro nejspolehlivější výsledek cervikální stěr.

Revize	30. 7. 2024
Autor:	Mgr. Markéta Tomšíčková